

# 接种 COVID-19 疫苗后的重要须知

## 接种疫苗后，我该怎么做？

接种疫苗后，留下观察 **15 分钟**，以确保您没事。在此期间，切勿驾驶车辆或其他各类交通工具。

如果担心出现疫苗过敏反应，则您可能需要留下观察 **30 分钟**。




## 倘若感觉不适或出现以下任何症状，请告知诊所工作人员：



荨麻疹（皮肤出现  
瘙痒肿块）



呼吸困难



面部、舌头或  
喉咙肿胀




头晕无力

## 接种疫苗后，我可能出现哪些症状？

### 接种疫苗的手臂上：

- 疼痛、发红或肿胀

注意：接种疫苗后，可能出现接种部位迟发性疼痛及红肿并持续数天。症状通常不会很严重，并将自行消退。



### 身体的其余部位：

- 发烧
- 发冷
- 疲劳
- 头痛
- 肌肉/关节疼痛



## 何时应致电医生

疫苗相关的过敏反应极为罕见，且大多于接种后三天内出现。如果您出现以下任何症状，请联系您的医生。如果您的症状较为严重，请致电 911。

- 荨麻疹
- 面部或嘴巴肿胀
- 呼吸困难
- 面色苍白且非常困倦
- 高烧（40 °C 以上）
- 抽搐或癫痫发作
- 其他严重症状（例如有针刺感或身体麻痹）



## 接种疫苗后，请谨记

继续遵守公共卫生措施，以防止 COVID-19 传播。



使用口罩  
遮住口鼻



与他人保持至少 2 米  
(6 英尺) 的距离



勤洗手



生病时自我隔离



咳嗽或打喷嚏时，用纸巾或衣袖遮住口鼻




如果出现症状，  
请接受检测



**接种 COVID-19 疫苗后**，如需接种其他任何疫苗，应等待至少 28 天后再接种（除非您的医生有其他建议）。

**接种 COVID-19 疫苗前**，如已接种其他任何疫苗，请等待至少 14 天后再接种 COVID-19 疫苗。

## 接种第二剂 COVID-19 疫苗



第一剂和第二剂的时间间隔取决于您所接种的疫苗以及公共卫生部门的指令。

- 请将本材料与您今日接种疫苗时所收到的打印版 COVID-19 免疫接种收据存放在安全之处。
- 接受第二剂疫苗时，请随身携带 COVID 免疫接种收据。

## 更多信息

如需获取更多信息和动态，请访问 [halton.ca/COVID19](https://halton.ca/COVID19) 或致电 311。

